

BINNAZ® 325 SC
FUNGICIDA AGRÍCOLA

INFORMACION GENERAL	
INGREDIENTE ACTIVO	Azoxystrobin, Difenoconazole
NOMBRE QUIMICO	Difenoconazole: 3-chloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl] phenyl 4-chlorophenyl ether Azoxystrobin: Methyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phenyl}-3-methoxyacrylate
GRUPO QUIMICO	Difenoconazole:Triazoles. Azoxystrobin: Strobirulinas
CONCENTRACION Y FORMULACION	Difenoconazole 125 g/L + Azoxystrobin 200 g/L SC
MODO DE ACCION	Sistémico
FABRICANTE/FORMULADOR	Kinyield Industry Co. Limited
DISTRIBUIDOR EN PERU	DEMETRA GROUP S.A.C.
TOXICIDAD	Ligeramente peligroso. Banda toxicológica azul.
ANTIDOTO	No tiene antídoto específico, su tratamiento es asintomático.
AUTORIZACION SENASA N°	PQUA N° 1389 - SENASA

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

BINNAZ® 325 SC es un fungicida, sistémico, de amplio espectro usado en los cultivos que se describen en el cuadro a continuación.

USOS Y DOSIS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Dosis L/200L	L/Ha.		
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.2	0.4	7	1.0* 0.1**
Cebolla	Mancha del Peral	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.1	0.3	3	0.5* 0.5*
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	-	0.5	30	5.0* 0.05*
Vid	Oidiosis	<i>Erisiphe necator</i>	-	0.5	14	2.0* 3.0**
Arándano	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	-	7	5.0* 4.0**
	Cabeza de clavo	<i>Alternaria tenuissima</i>	-	0.5		
	Roya del arándano	<i>Naohidemyces vaccinii</i>	0.2	-		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.15-0.20	0.45-0.6	7	5.0* 1.0**
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.15-0.2	0.3-0.4	7	3.0* 0.8**

P.C.: Periodo de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

*Azoxystrobin ** Difenoconazole

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Aplicar **BINNAZ® 325 SC** previa evaluación y cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. El número máximo de aplicaciones por campaña/año es 2. En el cultivo de alcachofa, aplicar máximo una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO

Arysta LifeScience Perú

www.arystalifescience.com

Fono: 51 1 2215729

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refieren.

No reingresar al campo antes de las 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BINNAZ[®] 325 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Excepto con bases fuertes y ácidas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea las dosis indicadas.

[®] Marca Registrada