

Poliquel* ZINC

INFORMACION GENERAL	
INGREDIENTE ACTIVO	Zinc
NOMBRE QUIMICO	Zinc (Zn)
GRUPO QUIMICO	Micronutrientes
CONCENTRACION Y FORMULACION (% EN PESO)	Zinc (Zn): 8.00 Diluyentes y acondicionadores: 92.00
MODO DE ACCION	Fertilizante líquido concentrado de alta solubilidad.
FABRICANTE/FORMULADOR	Grupo Bioquímico Mexicano, S.A. de C.V.
DISTRIBUIDOR EN PERU	DEMETRA GROUP S.A.C.
TOXICIDAD	LD50 Producto comercial Dermal: > 5000 mg/kg Oral: > 7000 mg/kg
ANTIDOTO	Edeteato de Calcio oral o intravenoso o Dimercaprol 4 dosis de 2,3 mg/kg intramuscular cada 4 h, después de una dosis diaria por 6 días.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Poliquel* ZINC es un fertilizante foliar líquido, de muy alta solubilidad y concentración, diseñado para cubrir las necesidades de Zinc en cultivos hortícolas, frutales, ornamentales, cereales y de granos. Sirve también para prevenir desórdenes fisiológicos originados por deficiencia de este elemento, especialmente en las etapas fisiológicas de máxima demanda. Las deficiencias de Zinc en forma general se manifiestan con hojas pequeñas, enrolladas y moteados cloróticos en casos menos severos.

USOS Y DOSIS (para uso foliar y fertirrigación)

Cultivo	Dosis (L/ha)	Época de aplicación
Algodonero	2 a 3	Durante la formación de cuadros y repita la aplicación de 2 a 3 veces durante la formación de bellotas.
Apio	2 a 3	Cuando las plantas tengan una altura de 10 a 20 cm y repetir a los 21 días.
Brócoli, coliflor, repollo, col de bruselas, lechuga, acelga y espinaca	2 a 3	Cuando las plantas tengan 4 a 6 hojas verdaderas y repita con 3 L/ha antes del inicio de la formación de la inflorescencia y posteriormente cada 2 a 3 semanas.
Palto	4 a 5	Antes del inicio de floración.
Alfalfa	2 a 3	Cuando el rebrote tenga de 15 a 20 cm y repetir después de cada corte.
Sandía, melón, pepino y calabaza	2 a 3	Antes del inicio de la floración y repita la aplicación 3 a 5 veces.
Cebolla	2 a 3	Según se requiera.
Cereales y granos	2 a 3	En estado de 5 hojas y repita antes del inicio de floración.
Jitomate (tomate), chile y páprika	2 a 3	A los 15 días del trasplante, en prefloración, al inicio del desarrollo de frutillos, y 15 a 21 días.

Fresa	3 a 4	15 días después del trasplante, repita antes del inicio de la floración y después de cada corte.
USOS Y DOSIS (Continuación)		
Cultivo	Dosis (L/ha)	Época de aplicación
Frutales caducifolios y perennifolios en general: Manzano, durazno, nogal, ciruelo, chabacano	2 a 3	Antes del inicio de floración y repetir a la caída de los pétalos.
Papa	2 a 3	Cuando las plantas tengan entre 10 y 30 cm de altura repita la aplicación.
Vid	2 a 3	Antes de floración y repita a los 20 y 40 días de la primera aplicación.

APLICACIÓN

Métodos para preparar el producto: Agite el producto antes de abrir y mézcle con suficiente agua para lograr un buen cubrimiento de follaje. Recomendamos emplear la técnica del "Triple Lavado".

Métodos para aplicar el producto: **Poliquel* ZINC** se aplica por aspersión, disuelto en suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje y puede también aplicarse con el agua de riego ya sea de gravedad, goteo, microjet o microaspersión.

INCOMPATIBILIDAD

Poliquel* ZINC es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de uso común, sin embargo conviene correr una prueba rápida antes de mezclar.

TIEMPO DE REINGRESO

No corresponde.

PERIODO DE CARENIA (DÍAS)

No corresponde establecer carencias.

OTRAS INFORMACIONES

No aplicar bajo condiciones de sequía, ni cuando exista alta probabilidad de lluvia.

*Marca Registrada.