



SATELLITE

HERBICIDA

INFORMACION GENERAL

INGREDIENTE ACTIVO	Pendimethalin
NOMBRE QUIMICO	N- (1-etilpropil) -2,6-dinitro-3,4-xilidina
GRUPO QUIMICO	Dinitroanilina
CONCENTRACION Y FORMULACION	456 g/L – Capsulas en suspensión - CS
MODO DE ACCION	Herbicida Pre-emergente
FORMULADOR	UPL Limited
DISTRIBUIDOR EN PERÚ	DEMETRA GROUP S.A.C.
TOXICIDAD	Ligeramente peligroso Cuidado. Banda Toxicológica Azul
ANTIDOTO	No Existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
AUTORIZACION SENASA N°	PQUA N° 1567 - SENASA

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

SATELLITE es un herbicida preemergente sistémico del grupo de las dinitroanilinas que afecta la germinación de las semillas de las malezas, inhibiendo el crecimiento de brotes y raíces, causándoles la muerte.

Cultivo	Plagas		Dosis (L/200L)	Dosis (L/Ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico				
Arroz	"Verdolaga" "Gramma china (gramalote)" "Coquito" "Rabo de zorro"	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Sorghum halepense</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Leptochloa fusca</i>	2.5	3.75	N.R.	0.05
Cebolla	"Verdolaga" "Pata de gallina" "Coquito"	<i>Portulaca oleracea</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Cyperus rotundus</i>	2.0 – 2.5	2.0 – 2.5	30	0.05
Caña de azúcar	"Pata de gallina" "Coquito" "Yuyo"	<i>Eleusine indica</i> <i>Cyperus rotundus</i> <i>Amaranthus dubius</i>	2.0 – 2.5	2.0 – 2.5	N.R.	0.05
Ajo	"Yuyo" "Pata de gallina" "Gramma dulce"	<i>Amaranthus hybridus</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Cynodon dactylon</i>	2.0 – 2.5	2.0 – 2.5	45	0.05

P.C.: periodo de carencia; L.M.R.: límite máximo de residuos; N.R.: No requiere

FORMA, FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Aplicar al suelo, cuando las malezas están en etapa de germinación. Realizar como máximo 1 aplicaciones por campaña por año. En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar resistencia.

PERIODO DE REINGRESO

Se puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

SATELLITE es compatible con la mayoría de herbicidas de uso común excepto los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se observaron síntomas de fitotoxicidad cuando fue aplicado en el cultivo y a la dosis recomendada.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.
- No contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.



Realice el triple lavado de los envases y elimine en los centros de acopio autorizados de Campo Limpio.

www.campolimpio.org.pe

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere.