



ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ SAC
GRUPO UPL

TRINICA 250 CS

INSECTICIDA AGRICOLA

INFORMACION GENERAL

INGREDIENTE ACTIVO	Lambda-cyhalothrin
NOMBRE QUIMICO	[(R)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
GRUPO QUIMICO	Piretroide
CONCENTRACION Y FORMULACION	250 g/L Cápsula en suspensión - CS
MODO DE ACCION	Contacto e ingestión
FORMULADOR	UPL Limited
TOXICIDAD	Banda amarilla, moderadamente peligroso, dañino.
ANTIDOTO	No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
AUTORIZACION SENASA N°	PQUA N°2180- SENASA

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

TRINICA 250 CS es un insecticida del grupo de los piretroides que actúa por contacto e ingestión, a nivel del sistema nervioso del insecto, a través de los canales de sodio, produciendo sobre-exitación nerviosa y luego la muerte.

TRINICA 250 CS, penetra la cutícula del insecto, interrumpe la conducción nerviosa en cuestión de minutos, esto conduce a la cesación de la alimentación, pérdida del control muscular, parálisis y finalmente la muerte. Tiene una protección adicional a los cultivos ya que proporciona un fuerte efecto repelente del insecticida hacia los insectos.

Cultivo	Plagas		Dosis (L/200L)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.25	14	0.1
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes suturicallus</i>	0.20 – 0.25	15	0.01

P.C.: periodo de carencia; L.M.R.: límite máximo de residuos.

FORMA, FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Aplicar previa evaluación de la plaga.

Como máximo aplicar dos veces por campaña y siempre previa evaluación.

Máximo aplicar 0.5 L/ha.

Para el cultivo de papa se recomienda aplicar 1 vez por campaña. Aplicar como máximo 0.25 L/Ha

Peligroso para abejas.

TRINICA 250 CS, se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego se debe vaciar la solución en el recipiente final, completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Mantener la mezcla en constante agitación.

PERIODO DE REINGRESO

Reingresar a la zona después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos.

UPL

www.upl-ltd.com

Fono: 719-4899

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere.

FT PQUA N°2180- SENASA V-002



ARYSTA LIFESCIENCE PERÚ SAC
GRUPO UPL

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico a la dosis, sistema de aplicación y cultivos recomendados en la etiqueta.



Realice el triple lavado de los envases y elimine en los centros de acopio autorizados de Campo Limpio.

www.campolimpio.org.pe

UPL

www.upl-ltd.com

Fono: 719-4899

Advertencia: Aunque las informaciones y recomendaciones contenidas aquí están expuestas con el mejor de nuestros conocimientos, y son consideradas correctas hasta la fecha del presente documento, no aceptaremos reclamaciones en cuanto a la exhaustividad o exactitud de las mismas. Este tipo de informaciones y recomendaciones no exoneran a personas que reciban las mismas de tomar sus propias decisiones que sean convenientes para su preferente aplicación práctica. Ningún reclamo o exigencia de garantía, ya sea expresa o implícita, de cualquier tipo o naturaleza, podrá hacerse en relación con las informaciones o recomendación o el producto al cual éstas últimas se refiere.

FT PQUA N°2180- SENASA V-002