DEMETRA GROUP SAC	FICHA TÉCNICA	VERSION: 01 FECHA: ABRIL 2022

TRIÓN
Ca

I. DATOS DE LA EMPRESA	
Importador y Distribuidor	DEMETRA GROUP S.A.C.

II. DATOS DEL PRODUCTO			
Nombre Comercial	**TRION Ca**		
Composición		(%p/p)	(%p/v)
	Calcio (CaO)	14.00	18.90
	Boro (B)	1.00	1.35
Clase de uso	Fertilizante Agrícola		

III. CARACTERÍSTICAS

TRION Ca es un producto fertilizante con una alta concentración en calcio que previene y corrige las posibles deficiencias de calcio en todo tipo de cultivos. Su especial formulación con ácidos orgánicos como complejantes del calcio, aseguran la plena asimilación de este elemento consiguiendo de esta manera un excelente desarrollo de las raíces, ramas, brotes y frutos, y en general de cualquier órgano en crecimiento.

TRION Ca, además esta enriquecido con boro, para favorecer el sinergismo existente entre estos dos elementos, mejorando la difícil translocación del calcio en el metabolismo de nuestros cultivos, permitiendo la llegada del mismo a partes apicales y frutos.

IV. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Apariencia: Líquido denso.
pH: 3 - 4
Densidad: 1.35 g/cc

V. COMPATIBILIDAD

TRION Ca es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios, sin embargo, recomendamos realizar pruebas previas a la aplicación a nivel de campo. No mezclar con aceites minerales, productos de alta reacción alcalina o básica, productos peroxiacéticos, hipocloritos, ni productos a base de compuestos cúpricos o azufre.

VI. FITOTOXICIDAD

TRION Ca no presenta ningún tipo de fitotoxicidad, al aplicarlo siguiendo las indicaciones dadas.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	L/200L	L/ha	RECOMENDACIONES
▪ Arándanos ▪ Fresa	0.5-1	-	Realizar aplicaciones cada 15 días para garantizar la fijación de Ca en fruto, calidad y consistencia.
▪ Limones ▪ Naranjos ▪ Mandarinos	0.5-1	-	Realizar un mínimo de 3 a 4 tratamientos focalizados.
▪ Manzano ▪ Melocotón	0.5-1	-	Realizar una aplicación en cuajado y 45 días para evitar rajaduras.
▪ Palto	0.5-1	-	Realizar la aplicación en floración y cuajado de fruto.
▪ Tomate ▪ Pimiento ▪ Ají	0.5-1	-	Realizar aplicaciones en cuajada de frutos, con respecto al tomate realizar aplicaciones cada 7 días.
▪ Vid	0.5-1	-	Realizar un mínimo de 3 a 4 tratamientos después de cuajados para garantizar la firmeza de las bayas.

VIII. CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU:106

DEMETRA GROUP S.A.C.:

Celular: 993829139

Teléfono: (51)1 575-4454