DEMETRA GROUP SAC	FICHA TÉCNICA	VERSION: 01 FECHA: ABRIL 2022

TRIÓN K

I. DATOS DE LA EMPRESA

Importador y Distribuidor	DEMETRA GROUP S.A.C.

II. DATOS DEL PRODUCTO

Nombre comercial	**TRION K**		
Composición		(%p/p)	(%p/v)
	Potasio (K_2O)	23.00	28.06
	Aminoácidos Libres (AA)	0.50	0.61
	L – Metionina	0.50	0.61
	Materia Orgánica Total (MOT)	27.50	33.55
Clase de uso	Fertilizante Agrícola		

III. CARACTERISTICAS

TRION K es un fertilizante líquido con un alto contenido de potasio en forma de carboxilato, que se encuentra totalmente disponible y asimilable por las plantas diseñado para prevenir y corregir las carencias en potasio de los cultivos y que no aumenta la conductividad eléctrica ni la alcalinidad del suelo o de la solución, presentándose como la fuente más dinámica en los aportes de potasio en las agriculturas profesionales.

TRION K además presenta en su composición el único aminoácido precursor de etileno de forma natural por parte del cultivo como es L-Metionina 0.61% (p/v); que a las dosis recomendadas de uso favorece de forma natural los procesos de maduración del fruto, mejorando su calidad, calibre y facilita la absorción del calcio y magnesio del suelo. El producto posee una perfecta estabilidad en un amplio rango de pH.

IV. PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Apariencia: Líquido incoloro.

pH: 7.48

Densidad: 1.22 g/cc

V. COMPATIBILIDAD

TRION K es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios, sin embargo, recomendamos realizar pruebas previas a la aplicación a nivel de campo. No mezclar con productos de alta reacción alcalina, muy ácidos o con alto poder oxidante. No mezclar con productos ni a base de compuestos cúpricos o azufre.

VI. FITOTOXICIDAD

TRION K no presenta ningún tipo de fitotoxicidad, al aplicarlo siguiendo las indicaciones dadas.

VII. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	L/200L	L/ha	RECOMENDACIONES
▪ Arándano ▪ Fresa	0.5- 1	-	4 a 6 tratamientos cada 15 días, comenzando las aplicaciones en la formación de fruto.
▪ Lechuga ▪ Espinaca ▪ Acelga ▪ Apio	0.5- 1	-	4 tratamientos cada 15 días, comenzando las aplicaciones después del primer abonamiento.
▪ Naranjos ▪ Mandarinos	0.5- 1	-	8 tratamientos cada 15 días, comenzando después del cuajado.
▪ Manzano ▪ Melocotón	0.5- 1	-	Aplicar después de cuajado y cada 15 días, hasta la cosecha para incrementar tamaño de fruto.
▪ Palto	0.5-1	-	Aplicar un mínimo de 3 tratamientos a los 60, 45 y 30 días antes de cosecha.
▪ Tomate ▪ Pimiento ▪ Ají	0.5-1	-	Aplicar un mínimo de 3 tratamientos antes de cosecha para obtener calibre y color.
▪ Vid	0.5-1	-	Aplicar en la última fase del cultivo.

VIII. CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU:106

DEMETRA GROUP S.A.C.:

Celular: 993829139

Teléfono: (51)1 575-4454